



發現秘密


(bimatoprost topical solution 0.03% w/v)

 **ALLERGAN**
Our pursuit. Life's potential.™

研究表明，睫毛隨年齡增長而減少

您的睫毛是不是比以前稀少了？是不是看起來稀少減短了？不是只有您這樣！新科學資料表示年齡增長也會影響睫毛。臨床研究表明，平均而言，在 20-30 歲之間，女性的睫毛開始變短、變稀，還會開始褪色。到 60 歲時，睫毛會明顯變稀、變短、顏色變淺。¹⁻⁴

這是正常情況下年輕睫毛和老化睫毛的對比。

年輕睫毛



較濃密



較長



顏色較深

老化睫毛



較稀少



較短



顏色較淺

獲得您夢寐以求的睫毛

少毛症是一個醫學術語，指您沒有足夠多的睫毛。不論您為什麼毛髮稀少，好消息是——您的醫生推薦 LATISSE[®]，一種安全有效的療法，經證明可在 8 週時間內刺激生長更為豐滿、濃密的睫毛。⁵

什麼是 LATISSE®?

LATISSE® 是一款在加拿大批准上市的處方睫毛產品，讓您的天然睫毛更長、更黑、更濃密。從第 8 週開始就有明顯視覺效果，第 12-16 週展現完美效果。⁵

僅需 8 週即可見效果

在臨床試驗中，大多數 LATISSE® 使用者在日常規律使用後的兩個月內就可看到睫毛大大改善。到第四個月結束，睫毛長度增加 25%，濃密度增加 106%，顏色加深 18%。78% 的試驗參與者睫毛整體突顯效果改善。結果？更長、更黑、更濃密的睫毛！⁵

LATISSE® 為何與眾不同？

不同於護理滋潤睫毛的非處方睫毛產品，或讓您的睫毛看起來更長的睫毛膏產品，LATISSE® 經臨床驗證，能確實明顯促進更長、更黑、更濃密睫毛的生長。¹ LATISSE® 已在加拿大經過臨床驗證和批准。⁵

LATISSE® 如何發揮作用？

LATISSE® 的作用是延長毛髮生長期，這是睫毛的積極生成期。具體如何實現睫毛改善因人而異。⁵

您自己的睫毛——更長、更黑、更濃密

LATISSE® 使用者未經修飾的真實照片，未使用睫毛膏。



*個人治療效果可能不同。

常見問題

如果使用 LATISSE[®]，我還可以刷睫毛膏嗎？

可以，使用 LATISSE[®] 期間刷睫毛膏完全沒有問題。

要是忘了使用 LATISSE[®] 怎麼辦？

如果您有一天晚上忘了用，不要多加用量嘗試補上。第二天晚上像往常一樣使用一滴 LATISSE[®]，按計劃進行。

如果我停止使用 LATISSE[®] 會怎麼樣？

如果停用 LATISSE[®]，睫毛會逐漸恢復到原來的樣子。

存在副作用嗎？

使用 LATISSE[®] 睫毛增長液後最常見的副作用是眼睛有發癢的感覺和／或眼睛發紅。大約 4% 的患者報告這些副作用。LATISSE[®] 睫毛增長液可能導致其他較不常見的副作用，通常發生在接近塗刷 LATISSE[®] 處的皮膚或眼睛裡。包括皮膚顏色加深、眼睛發炎、眼睛乾澀、眼瞼發紅。⁵

使用 LATISSE[®] 是否會導致我的眼睛變色？

使用 LATISSE[®] 與虹膜色素沉澱（眼睛有色部分棕色色素沉澱加深）有關。這一色素沉澱可能是永久性的。過量使用 LATISSE[®]（超過需要的藥量）可能導致這一色素沉澱，所以務必遵循如何使用 LATISSE[®] 的說明。⁵

使用 LATISSE[®] 是否會導致眼瞼色素沉澱？

LATISSE[®] 可能導致眼瞼皮膚顏色加深，在大多數患者身上可恢復。⁵

任何人都可以使用 LATISSE[®] 嗎？

如果您對 LATISSE[®] 的任何成分過敏，則不得使用。同樣，若以下任何情況適用於您，您應在開始使用 LATISSE[®] 前諮詢您的醫生或眼部護理專科醫生。

- 先前診斷的眼壓問題（尤其是眼內壓升高）。
- 目前為治療眼壓問題（尤其是眼內壓）使用藥物。如果情況如此，您在使用 LATISSE[®] 時應有人密切監控。
- 青光眼的風險因素，包括青光眼的家族病史。請在開始使用 LATISSE[®] 前諮詢眼部護理專科醫生。

LATISSE® 使用步驟

第一步

每晚使用一次，首先確保清潔臉部，卸妝，取出隱形眼鏡。



第二步

從托盤里取出一支塗藥刷。將未經修剪的無菌塗藥刷水平拿好，僅滴一滴 LATISSE® 在塗藥刷接近頂端但不是頂端的地方。



第三步

立即將未經修剪的塗藥刷小心刷過睫毛根部上眼瞼邊緣皮膚（睫毛與皮膚交界的地方），從眼線內部向外部刷。



第四步

吸出任何眼瞼邊緣外的多餘溶液。



第五步

一次使用後丟棄塗藥刷。使用一把新的無菌塗藥刷在另一邊上眼瞼邊緣重複上述步驟。這有助於儘量降低一邊眼瞼污染另一邊眼瞼的可能性。



安全資訊

LATISSE® 睫毛增長液用於治療少毛症（少於正常毛髮量），讓睫毛更長、更黑、更濃密。

如果您對比馬前列素或其他任何成分或容器的任何部分過敏，請勿使用 LATISSE®。如果擔心會過敏，請諮詢您的醫生。

使用 LATISSE® 前請就以下情況諮詢您的醫生：如果您沒有睫毛；您懷孕或正在哺乳；您患有活性眼部感染或發炎，眼瞼疾病、眼瞼感染、眼瞼皮膚破損或疼痛、眼部受傷；或您需要進行眼部手術。如果您正在使用或近期使用過任何其他藥物，尤其是減輕眼內壓的青光眼治療藥物，請謹遵醫囑使用 LATISSE®。

LATISSE® 適用於睫毛根部的上眼瞼邊緣。不要用於下眼瞼。

LATISSE® 睫毛增長液可能造成眼睛有色部分（虹膜）的棕色色素沉澱加深，而且可能是永久性的。過量使用 LATISSE®（如滴一滴以上在塗藥刷上）可能導致色素沉澱，因此務必遵循醫囑，並記住：

- 不要直接滴進眼睛。
- 不要在專門提供的無菌塗藥刷上滴超過一滴。
- 用紙巾或其他吸水性材料將任何多餘溶液從上眼瞼邊緣吸走。
- 一天僅使用一次。
- 不要用於下眼瞼眼線。
- 不要將同一個塗藥刷用於不同眼睛。不要重複使用塗藥刷或以任何方式修剪，不要使用任何其他刷子／塗藥刷塗刷 LATISSE®
- 如果錯過了一劑，不要試圖「補上」。第二天晚上再塗刷 LATISSE®。不要把劑量加倍。

與所有藥物一樣，LATISSE® 也會產生副作用。大多數副作用並不嚴重。

最常見的副作用是發癢和／或眼睛發紅。大約 4% 的患者報告這一副作用。較不常見的副作用通常發生在接近塗刷 LATISSE® 處的皮膚，或眼睛裡。包括眼瞼皮膚顏色加深（可能恢復），虹膜色素沉澱、眼睛發炎、眼睛乾澀、眼瞼發紅。LATISSE® 經常碰到的其他皮膚部位可能會長出毛髮。用紙巾或吸水性材料將任何多餘溶液從上眼瞼邊緣吸走。不同眼睛的睫毛長度、濃密度、豐滿度、色素沉澱、睫毛數量和／或睫毛生長方向可能不同。如果停用 LATISSE®，睫毛會逐漸恢復到原來的樣子。

如果 LATISSE[®] 溶液不慎跑到眼睛裡，一般不會造成傷害。塗刷 LATISSE[®] 可能會暫時模糊您的視線。在視線變得清晰前，不要開車或使用機器。

不要讓藥瓶頂端或塗藥刷接觸到周圍結構、手指或其他表面，以避免造成細菌污染／感染。

LATISSE[®] 含有名為苯紮氯鉍的防腐劑，可能會導致隱形眼鏡褪色。如果您佩戴隱形眼鏡，請在使用 LATISSE[®] 前摘除可在使用 LATISSE[®] 後 15 分鐘重新戴上。

如果您患上新的眼部疾病（如外傷或感染），視力突然下降，接受眼部手術，或發生眼部反應，尤其是結膜炎（眼瞼感染）和眼瞼反應，您應立即諮詢醫生是否應繼續使用 LATISSE[®] 睫毛增長液。

這並非副作用的完整列表。使用 LATISSE[®] 時如發生意料之外的副作用，請與醫生聯絡。

讓您的睫毛加倍濃密*



處方治療，僅 8-12 週，為您帶來
更長、更黑、更濃密的睫毛
請造訪 www.latisse.ca，尋找合資格醫生。

*個人治療效果可能不同。
本手冊僅在醫生患者諮詢中分發。

參考：1. 存檔資料，Allergan, Inc., 2008 年；研究編號 192024-032。
2. 存檔資料，Allergan, Inc., 2008 年；研究編號 192024-038。3. 存檔資料，Allergan, Inc., 2008 年；研究編號 192024-051。4. 存檔資料，Allergan, Inc.；混合基線分析，2011 年。5. LATISSE[®] 產品專題論文第三部分：消費者資訊。2013 年 1 月 7 日。本手冊提供給醫生，作為患者教育工具。沒有醫囑請勿分發。
LATISSE[®] 是 Allergan, Inc. 的註冊商標，Allergan, Inc. 的™ 商標。保留所有權利。
© 2013 年 Allergan, Inc. 版權所有。

FA-Latisse-BROCH-02-13-C